Технологическая информация

PanAmerican Seed™

Гвоздика Corona™ F 1 Series

(Dianthus chinensis) Однолетние культуры (проверено 20.02.18)

Увенчанная огромной силой цветов

Гвоздика с огромными, самыми крупными среди гвоздики данного типа цветами…исключительная форма цветка…и палитра сногсшибательных окрасок. Corona добавляет изысканности цветникам в холодное время года, будет ярким украшением сада и патио.

Период от посева до пикировки: 4 - 6 недель
Период от пикировки до получения готового растения: 6 - 8 недель

- Corona характеризуется более крупными цветами, чем у конкурирующих сортов, плюс выравненность по срокам цветения и габитусу растений.
- Раскрывает многочисленные цветы на компактных, крепких растениях.
- Показывает лучший результат при выращивании в холодных условиях. Подходит для выращивания ранней весной совместно с другими ранне-цветущими однолетниками, например виолой.

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Рання весна, Весна, Поздняя весна, Лето, Ранняя осень, Осень	(20-25 cm)	(20-25 cm)	(20-25 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер кассеты	Самян в ячейке	Период от посева до пикировки	Появление всходов	Значения pH/EC в субстрате	Присыпание семян
пеллетированные	288	1	4-6	3-5	5.8-6.2 pH 0.75 mmhos/cm	Требуется

Информация по производству сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-3	Уровень 2-3
Температура	18-20°C	18-21°C	16-18°C	13-16°C
Свет	Опционально	5-8 mol·m^{-2}·d^{-1}	8-10 mol·m^{-2}·d^{-1}	10 mol·m^{-2}·d^{-1}
Концентрация удобрений		Менее чем 0.7 EC	0.7 to 1.2 EC	0.7 to 1.2 EC
Ингибиторы роста		paclobutrazol/5 ppm/опрыскивание	paclobutrazol/5 ppm/опрыскивание	

Дальнейшее выращивание до получения готовой продукции

Температура выращивания	Уровни в почве pH/EC	Концентрация удобрений	Длина дня
Дневная 16-22°C **Ночная** 10-16°C	5.8-6.2 pH 1.5-2.0 mmhos/cm	1.2 - 1.5 EC	Растение длинного дня

Производственное планирование

Посадочная емкость	Растений на горшок	Период от пикировки до готового растения	Сезон	Ингибиторы роста
Кассета	1	6-8 (недель)	Поздняя весна	paclobutrazol 10 ppm опрыскивание
Горшок диам.12-13 cm	1	6-8 (недель)	Поздняя весна	paclobutrazol 10 ppm опрыскивание

Ключевые факторы роста

Развивается лучше в условиях высокой интенсивности света и низких ночных температур. В условиях низкой интенсивности света цветение может задержаться.

Обратите внимание: Производитель рассады должен использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сортов

Cherry Red

Rose

Strawberry

White

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road,West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

PanAmerican Seed™

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company